INFORME FINAL DE RESULTADOS

PILOTAJE DE DISPONIBILIDAD Y DISPENSACIÓN DE CONDONES FEMENINOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD Y EL ÁMBITO COMUNITARIO • UPALA Y GOICOECHEA

MODELOS DE DISPENSACIÓN

CON CITA MÉDICA

Registros médicos → Pre-consulta → Consulta → Aplicación cuestionario → Farmacia

Promoción y Capacitación

Dispensación y Registro / Control

Boleta/Receta de dispensación de CF

SIN CITA MÉDICA

Solicitud de información / guía (diferentes ventanillas, guardas, personal de limpieza, otros).

- Centro de salud → Enfermería - ATAPs horario contínuo / programado → Aplicación Cuestionario → Dispensación en farmacia (Control SIFA)
- ONGs o grupos organizados → Aplicación Cuestionario → Dispensación Directa*
- Visita domiciliar (ATAP) → Aplicación Cuestionario → Dispensación Directa*

Actualmente en el país los condones (masculinos) solo son dispensados por receta médica, y no se distribuye fuera de los centros de salud

¿Dónde se entregaron los Condones Femeninos?

2 de cada 10 mujeres recibieron condones en el ámbito comunitario

ESPACIO	FRECUENCIA	%
Centro de Salud	1039	78,4
Comunitario/ATAP	198	14,9
Comunitario/CENDEROS	83	6,3
No responde	5	0,4
Total	1325	100

¿Quién entregó los condones femeninos?

7 de cada 10 mujeres recibieron los condones de personal **NO** médico

FUNCIONARIO (A)	FRECUENCIA	%
Enfermero(a)/Auxiliar de Enfermería	612	46,2
Médico(a)	443	33,4
ATAP	173	13,1
Promotora comunitaria	83	6,3
NR	14	1,1
Total	1325	100

PERFIL DE USUARIAS

Edad Promedio: 32.9 años

Mujeres de todos los estados civiles

Promedio de hijos(as): 1.76

14.5%

de las mujeres usaron el condón femenino **REGULARMENTE**

En la ENSSR del 2010 se reportó un 10% de uso del condón masculino

PERFIL DE USO

31.9% NO usaba ningún método anticonceptivo antes del pilotaje

Se dispensaron en promedio 13.60 condones por persona

PORCENTAJE DE USUARIAS REGULARES DEL CONDÓN FEMENINO, POR ÁREA DE SALUD

De un total de 1325 mujeres que participaron del Pilotaje, 192 solicitaron reabastecimiento de condones, por lo que mostraron un uso más regular, mientras que las restantes 1124 solicitaron condones femeninos solamente una vez

ÁREA DE SALUD	% DE USUARIAS REGULARES DEL CONDÓN FEMENINO
Upala	6.9%
Goicoechea	7.6%
Total	14.5%

CONCLUSIONES

1. El condón femenino tiene demanda; incluso mayor que la del condón masculino.
2. El condón femenino responde a una necesidad insatisfecha por la oferta hasta ahora existente.
3. Las estrategias novedosas de dispensación fueron un éxito.
4. Incorporar el condón femenino en la oferta nacional requiere un trabajo arduo de sensibilización y capacitación al personal de salud.

La información de este documento, fue extraída de: **INFORME FINAL DE RESULTADOS: Pilotaje de disponibilidad y dispensación de condones femeninos en los servicios de salud y el ámbito comunitario. Upala y Goicoechea.** San José, Costa Rica.

SEGURO SOCIAL COSTA RICA

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas